



Il principio del semaforo Affrontare un'emergenza

Direttive di rianimazione (BLS) del Consiglio svizzero per la rianimazione (SRC) BSL + DAE adulti, bambini e neonati (da 1 mese) **AED**: Automatic Externe Defibrillator = DAE defibrillatore automatico esterno

BLS: Basic Life Support = prime misure di rianimazione

SRC: Swiss Resuscitation Council (= Consiglio svizzero per la rianimazione)

Segnali d'emergenza per l'elicottero di salvataggio

Numeri di telefono importanti per emergenze

Allarmare

Contenuto del messaggio d'allarme

Analizzare la situazione

- Che cosa è successo?
- Chi è presente?
- Chi è coinvolto?
- Quante persone sono coinvolte?

Vedere i pericoli

- Pericolo per le vittime?
- Pericolo per i soccorritori?
- Pericoli per terzi?

Messa in sicurezza

Prestare soccorso

Allarmare aiuto professionale 144 Ambulanza 1414 Rega (in CH)

Rosso = guardare

Applicare le direttive (BLS) e lo schema del defibrillatore esterno automatico (DAE)

Rapido controllo concernente la sicurezza della scena (soprattutto intossicazioni ed elettricità)

Persona priva di coscienza Respirazione mancante o anormale

Chiamare aiuto ad alta voce Allarmare tel. 144 Prendere o richiedere il DAE

30 compressioni toraciche (100-120/min) seguite da 2 ventilazioni

All'arrivo del DAE accendere e seguire le istruzioni

Prestare attenzione a:

- compressioni toraciche **5-6 cm risp.** ¹/₃ del diametro della cassa toracica nei bambini
- interruzione minimale
- luogo di compressione **al centro** della cassa toracica
- rilascio completo
- ventilazione: movimenti **visibili** del torace!

- Travers AH, et al., 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations
- Maconochie IK, et al., 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations

Sì Serve aiuto (a braccia ferme)

NO Non serve aiuto (a braccia ferme)

N come No

Medico di famiglia Pediatra Ospedale Servizio di picchetto medico

Famiglia/amici

Informazioni Istituto

tossicologico

Polizia Rega (CH) Rega (estero) +41 333 333 333

Servizio autoambulanza • Chi chiama? • Che cosa è successo?

- Quando è successo?
- 1414 Dove (località precisa)
 - Quanti feriti
 - Altri pericoli

Quando si allarma un elicottero:

- linee elettriche
- funi

meteo sul posto

rega 🥕

Primo soccorso	nel caso di escoriazioni	nel caso di emorragie	nel caso di distorsioni o contusioni	nel caso di ustioni/ scottature	nel caso di punture d'insetti	nel caso di punture di zecche	nel caso d'infarto cardiaco	nel caso di ictus	nel caso di lesioni alla schiena	nel caso di fratture	nel caso di vesciche ai piedi
Indossare guanti di protezione per evitare infezioni. Imparate a salvare vite! Offerte di corsi di primo soccorso sul sito internet www.sirmed.ch	 Pulire e disinfettare la ferita con salviettine disinfettanti (oppure disinfettante liquido), non usare né talco né pomate. Cerotto sterile (specifico per 	 Far sdraiare il ferito che sanguina. Sollevare la parte ferita. Comprimere la parte: premere una garza sterile sulla ferita e fissarla con un bendaggio elastico. Emorragia forte: applicare un bendaggio di compressione, consultare o allarmare un medico. Se manca il materiale, improvvisare: usare come fascia di compressione strisce di stoffa e fissarle con una cintura. Possono essere utili anche sassi e rami. 	 Immobilizzare e sollevare la parte lesa. Per alleviare dolore e gonfiore, applicare il freddo: ad es. bendaggi refrigeranti, impacchi freddi o borsa del ghiaccio/cuscinetti refrigeranti (non sulla pelle) fissati con benda elastica, senza stringere. Applicare il freddo anche sugli ematomi, vedi spiegazioni sopra. Nei casi più gravi, considerare sempre le lesioni interne, soprattutto nella zona addominale. In caso di dubbio, contattare un medico. 	corpo piccole con acqua per 15-20 minuti (non usare ghiaccio né acqua ghiacciata). Attenzione: soprattutto nei bambini, evitare l'ipotermia.	 Se il pungiglione è visibile, rimuoverlo delicatamente con una pinzetta. In caso di gonfiore della cavità orale o di disturbi circolatori e/o di alterazioni della coscienza: consultare subito un medico e, se necessario, adottare misure immediate salva vita. Se è nota un'allergia, somministrare il farmaco d'emergenza prescritto. Raffreddare la parte gonfia (ad es. con gel refrigerante) e tenerla sollevata. 	 Per rimuovere una zecca, usare la carta togli-zecche o una pinzetta. Disinfettare bene la puntura. Seguire i consigli della Lega svizzera dei malati vittime delle zecche LIZ: www.zeckenliga.ch (in tedesco e francese). 	Allarmare i servizi di soccorso. Sistemare il paziente sollevandogli il busto e tranquillizzarlo. Paziente privo di conoscenza o che non respira: eseguire la rianimazione. Imparate a salvare vite! Ad es. presso i samaritani locali. Corsi riconosciuti e indirizzi su www.resuscitation.ch www.sirmed.ch	 Allarmare immediatamente il servizio di soccorso (ogni minuto conta). Non dare cibo, bevande o farmaci. Se il paziente è incosciente o ha problemi respiratori, metterlo in posizione laterale di sicurezza. In assenza di respirazione, eseguire la rianimazione. 	 Allarmare il servizio di soccorso. Il paziente deve rimanere disteso senza muoversi, evitando di rispondere alle domande facendo cenno con il capo. In caso di dolori al rachide cervicale, non muovere la testa. In caso d'incoscienza e respirazione assente: posizione supina e ventilazione artificiale. Proteggere il paziente dal freddo. 	 Immobilizzare/steccare/sollevare. Muovere il meno possibile la parte del corpo lesa. Non ricom- porre la frattura. Nel caso di frattura aperta, appli- care una medicazione sterile. Allarmare il servizio di soccorso (consultare il medico). 	 Se durante una gita si forma una vescica ancora intatta, applicare un cerotto contro le vesciche. Se la vescica è scoppiata, disinfettare e coprire con garza sterile risp. cerotto speciale.